

Gewrichtsinjectie onder narcose

bij een kind met juveniele idiopathische artritis

Inleiding

Bij kinderen met juveniele idiopathische artritis (JIA) kan een injectie in het gewricht met een krachtig ontstekingsremmend middel, triamcinolon acetonide (Kenacort) of triamcinolon hexacetonide (Lederspan), worden overwogen. Bij kleine en/of angstige kinderen kan een dergelijke injectie onder kortdurende narcose plaatsvinden. Hiervoor wordt het kind dan enkele uren opgenomen op de kinderafdeling van de afdeling orthopedie van de Sint Maartenskliniek.

Vorbereiding

Uw kind moet 's ochtends rond 07.30 uur nuchter (na middernacht niets meer eten of drinken, ook niet bij het tandenpoetsen) aanwezig zijn op afdeling C2, de kinderorthopedie afdeling.

Aankomst in het ziekenhuis

Allereerst meldt u uw komst bij het opnamebureau voor de administratieve registratie. Dit is bij de hoofdingang. Daarna wordt uw kind verwacht op verpleegafdeling C2 en zal door een afdelingsverpleegkundige opgenomen worden. De verpleegkundige legt uit wat u en uw kind kunnen verwachten tijdens deze opname. De reumatoloog verricht een kort lichamenlijk onderzoek inclusief de aangedane gewricht(en) van uw kind.

De operatieruimte

Uw kind gaat rond 09.00 uur samen met u en een verpleegkundige naar de operatiekamer. Eén van de ouders kleedt zich om in operatiekleding met muts en schoenbeschermers en loopt samen met het kind en een OK-verpleegkundige naar de voorbereidingsruimte. Daar worden u en uw kind verder begeleid door de anesthesie-verpleegkundige en de anesthesist. De reumatoloog is in de operatieruimte aanwezig om de injectie klaar te maken. Vervolgens wordt uw kind met een kapje onder narcose gebracht en wordt de injectie in het gewricht gegeven.

Als uw kind slaapt, wordt u door een verpleegkundige teruggebracht naar de wachtruimte bij het OK-complex. Later mag u weer naar uw kind toe in de uitslaapkamer. Als alles afgerond is, wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht waar het meestal snel wakker wordt.

Aanwezigheid ouder voor, tijdens en na de injectie

U als ouder mag, indien u dat wilt, bij uw kind blijven totdat uw kind slaapt. Echter, wanneer de anesthesist of de reumatoloog vindt dat dit ongewenst is in het belang van de injectie en uw kind, dan wordt aan de ouder gevraagd te wachten in de wachtkamer bij de uitslaapkamer. Wanneer uw kind uit de narcose ontwaakt, kunt u hem/haar weer zien. Wanneer uw kind goed wakker is, mag hij/zij weer terug naar verpleegafdeling C2. Daar krijgt uw kind wat te eten en te drinken en wordt er gezorgd voor een ontspannen sfeer. Rond 10.30 uur mag uw kind naar huis.

Na de injectie

Het is verstandig dat uw kind vooral de eerste dag na de injectie rustig aan doet en het ingespoten gewricht zo min mogelijk belast. Uw kind merkt weinig van de injectie maar kan soms wel wat last hebben van napijn. De ontstekingsactiviteit in het gewricht vermindert meestal binnen enkele dagen en hierna kan het gewricht volledig belast worden. Bij een goed effect kan de injectie, wanneer de gewrichtsontsteking terugkomt, nogmaals herhaald worden.

Wat te doen als uw afspraak niet door kan gaan

Als de afspraak voor de injectie niet door kan gaan, neemt u zo snel mogelijk contact op met de polikliniek reumatologie, via telefoonnummer (024) 365 94 09.

Meer informatie of vragen Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek reumatologie via telefoonnummer (024) 365 94 09.

Colofon Uitgave van de afdeling communicatie, i.s.m. het reuma- en orthopaediecentrum

november 2010

Artikelcode 1044880

Bezoekadres Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen
Postadres Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen
Telefoon (024) 365 99 11
Telefax (024) 365 92 04
Internet www.maartenskliniek.nl



Sint Maartenskliniek

NIJMEGEN