

Meer informatie of vragen Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de pijnconsulenten:
telefoonnummer (024) 327 2950 of per e-mail
pijnconsulenten@maartenskliniek.nl

Colofon Uitgave van de afdeling Communicatie, i.s.m. het
Pijnbehandelcentrum

januari 2011

Artikelcode 1037293


Bezoekadres Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen
Postadres Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen
Telefoon (024) 365 99 11
Telefax (024) 365 92 04
Internet www.maartenskliniek.nl



Sint Maartenskliniek

Blokkade van het ganglion stellatum

Sterk in beweging



De pijnspecialist heeft in overleg met u een blokkade van het ganglion stellatum afgesproken. Voor deze behandeling krijgt u tijdig een schriftelijke of telefonische oproep via het afsprakenbureau.

Deze behandeling kan worden uitgevoerd als u last heeft van:

- bij pijn in de schouder, arm of hand
- bij temperatuurverschil en/of overmatige transpiratie in arm of hand
- bij een bepaald soort hoofdpijn

Vorbereiding.

De behandeling gebeurt meestal in een korte dagopname. U mag gewoon eten en drinken.

Speciale aandachtspunten

- U mag na de behandeling niet zelf auto rijden. **Zorg voor begeleiding.**
- Gebruikt u bloedverdünnende medicatie? Let op:
 1. De medicijnen Ascal of acetylsalicylzuur mag u blijven gebruiken.
 2. Gebruikt u bloedverdünners en staat u daarvoor onder controle bij de trombosedienst, dan moet u in overleg met de pijnspecialist of trombosedienst het gebruik van deze medicijnen enkele dagen voor de behandeling staken.
- Heeft u koorts op de dag van behandeling, neem dan contact op met de secretaresse van de afdeling pijnbehandeling, tel.: 024-3659772.
- Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan bij de pijnspecialist of verpleegkundige.
- Neem tevens contact op met de pijnspecialist of verpleegkundige als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. De röntgenstraling kan namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

De ligging van het ganglion stellatum

Het ganglion stellatum is een zenuwknop; er zijn er twee. Deze liggen links en rechts van de wervelkolom, aan de voorkant van de wervels ter hoogte van de zesde en zevende halswervel en de eerste borstwervel.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op de rug en wordt u in de hals geprikt. Onder röntgendoorlichting wordt de juiste positie bepaald voor de naald. Via de naald wordt een verdovingsvloeistof ingespoten.

Nazorg

Meestal bent u binnen een ½ tot 1 uur hersteld van de behandeling en mag u naar huis. De totale tijdsduur van het verblijf in het ziekenhuis is 2 tot 3 uur.

Wat kunt u verwachten na de behandeling:

1. Een bloeditstorting.
2. Heesheid. Dit kan enkele uren duren.
3. Slikklachten. Deze zijn kortdurend van aard.
4. Een hangend ooglid, wazig zien en een loopneus. Deze symptomen zijn onschuldig en verdwijnen zodra de verdoving uitgewerkt is.
5. Kortademigheid en hoesten. Deze complicatie komt uiterst zelden voor. Als de kortademigheid binnen 24 uur na de behandeling ernstiger wordt, kan dit duiden op een 'klaplong'. In dit geval dient u contact met ons op te nemen.
6. Warmtesensatie in de arm of hand
7. Napijn. U kunt hiervoor pijnstilling gebruiken.

Het effect van de behandeling wordt na 3 weken beoordeeld. U wordt gebeld door de pijnconsulente voor een evaluatie.