



Sint Maartenskliniek

## Ik heb een infectie

Om een infectie aan botten of gewrichten te behandelen is vaak een operatie nodig. Waarna een langdurige antibioticakuur van zes tot twaalf weken volgt. Op deze pagina leest u meer over de behandeling met antibiotica. Ook kunt u doorklikken naar de verschillende operaties.

## Operaties bij een infectie

Ga hier naar de operatie die voor jou relevant is.

## Behandeling met antibiotica

Deze behandeling wordt door het infectie team op maat gekozen en bestaat soms uit een combinatie van verschillende soorten antibiotica. In de meeste gevallen wordt de antibiotica in tabletvorm gegeven, maar in sommige gevallen is een behandeling via het infuus nodig. Een thuisbehandeling via het infuus noemen we Out Patient Antimicrobial Treatment (OPAT). Als tijdens uw behandeling met antibiotica er nieuwe kweken zijn afgenomen (u was niet voor uw operatie gestopt), dan gaat u door met uw kuur zoals met u is afgesproken. Mocht de behandeling moeten worden aangepast, dan hoort u dit van ons.

## Informatie over antibiotica

---

Lees hier meer over antibiotica, over bijvoorbeeld bijwerkingen.

- [Amoxicilline](#)
- [Amoxicilline/clavulaanzuur](#)
- [Benzylpenicilline](#)

- [Ceftazidim](#)
- [Ceftriaxon](#)
- [Ciprofloxacine](#)
- [Cotrimoxazol](#)
- [Doxycycline](#)
- [Flucloxacilline](#)
- [Levofloxacine](#)
- [Linezolid](#)
- [Meropenem](#)
- [Metronidazol](#)
- [Piperacilline/Tazobactam](#)
- [Rifampicine](#)
- [Teicoplanine](#)
- [Vancomycine](#)

## Zorg voor toediening via het infuus

---

Een aantal antibiotica kunnen alleen via het infuus gegeven worden. Wanneer u antibiotica via een infuus krijgt, wordt de vloeistof direct via uw bloedvat toegediend met behulp van een speciaal infuus (lange lijn of PICC-lijn). Dit infuus kan lange tijd blijven zitten. De behandeling starten we in het ziekenhuis. Eenmaal thuis kan de behandeling doorgaan met hulp van een gespecialiseerde thuiszorg verpleegkundige. De verpleegkundige van de thuiszorg dient de antibiotica toe en verzorgt de PICC-lijn.

Onderstaande aandachtspunten zijn hierbij belangrijk:

- Bij problemen met het aan- en afkoppelen en de lokale verzorging, neemt u contact op met uw thuiszorg verpleegkundige.
- Bij twijfel over een plaatselijke huidirritatie bij de insteekopening van de lange lijn, overlegt u in eerste instantie met uw thuiszorg verpleegkundige.

Als uw antibioticakuur is afgerond en de PICC-lijn niet meer gebruikt wordt dan moet deze, het liefst binnen 24 uur, worden verwijderd door een arts of thuiszorg verpleegkundige. Meestal krijgt u deze datum en tijd vooraf van ons te horen. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met de infectie nazorgpoli door te bellen naar **(024) 327 26 70**

## Begeleiding van het infectienazorg team

Het kan zijn dat u tijdens de behandeling met antibiotica vragen of bijwerkingen heeft. Misschien vindt u het moeilijk om de behandeling vol te houden of om de inname van tabletten niet te vergeten. In de Sint Maartenskliniek zijn we ons ervan bewust dat de behandeling zwaar kan zijn en daarom hebben we

een begeleidingsprogramma ontwikkeld. U wordt begeleid door de infectieazorg verpleegkundigen. Lees hier meer over.

## Kennismakingsgesprek infectieazorg team

---

U weet wat uw behandelplan tegen de infectie is. Zodra uw behandelplan heeft, komt één van onze infectieazorg verpleegkundigen kennismaken met u. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats als u nog in het ziekenhuis ligt. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er kort na het ontslag een kennismakingsgesprek gepland via de telefoon. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over uw begeleiding. Hieronder kunt u nalezen wat er besproken is.

## Direct contact opnemen bij klachten

---

Antibiotica kan verschillende bijwerkingen hebben. In het begin van de eerste week kunt u zich moe en hangerig voelen. Ook kunt u last krijgen van uw maag of buik. In de meeste gevallen nemen deze klachten in de loop van de eerste week af. U moet **direct bellen naar de infectieazorg poli: (024) 327 26 70** (ook 's avonds en in het weekend) als u last krijgt van de volgende bijwerkingen:

- Diarree en braken, langer dan 3 dagen
- Huiduitslag
- Jeuk
- Geel oogwit
- Koorts
- Nieuwe pijn, roodheid, lekkage of pus in het geopereerde gebied
- Roodheid of pus bij de (insteek van de) PICC-lijn
- Bij twijfel

Heeft u andere vragen of klachten die kunnen wachten? Neem dan contact op met het infectieazorg team door te mailen naar [infectieazorg@maartenskliniek.nl](mailto:infectieazorg@maartenskliniek.nl) of bel naar (024) 327 2670

## Controle momenten en bloedafname

---

Bij langdurig gebruik van antibiotica is het belangrijk dat uw bloedwaarden worden gecontroleerd.

Afhankelijk van uw reisafstand is met u afgesproken waar u bloed laat prikken. Dit kan bij de huisarts/lokale prikpost of bij ons in de Sint Maartenskliniek. U krijgt formulieren voor de bloedafname mee. Wanneer de uitslag bekend is wordt dat naar ons toegestuurd, dit kan een paar dagen duren.

## Telefonisch bespreken van uitslagen

De infectieazorg verpleegkundige bespreekt uw bloedsuitslagen met de internist en vervolgens

telefonisch met u.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. In dit gesprek worden ook de eventuele bijwerkingen of problemen van de antibiotica behandeling besproken. U kunt daarnaast ook vragen stellen over de behandeling of de antibiotica. Indien nodig wordt er een afspraak bij de internist of orthopeed op de polikliniek gepland. U kunt tussendoor zelf ook contact opnemen met een infectienazorg verpleegkundige door te bellen naar: **(024) 327 26 70** of te mailen naar: [infectienazorg@maartenskliniek.nl](mailto:infectienazorg@maartenskliniek.nl)