



Sint Maartenskliniek

## Herstellen SC-gewricht

Met een operatie aan het sternoclaviculaire gewricht (SC-gewricht), wordt de stabiliteit in uw SC-gewricht hersteld.

### Waarom?

Het sternoclaviculaire gewricht wordt gevormd door het uiteinde van de clavicula (sleutelbeen) en het sternum (borstbeen). Tussen de twee botten ligt een meniscus (kraakbeenrand) die als stootbumper fungeert. Om het gewricht bevindt zich een gewrichtskapsel. De stabiliteit van dit gewricht kan afnemen door bijvoorbeeld een ongeval, of als gevolg van veel sporten. Dit veroorzaakt pijnklachten en irritatie van het gewricht. Als gevolg van de instabiliteit van uw SC-gewricht kan ook het kraakbeen van het gewricht beschadigd raken.

Andere namen voor deze operatie zijn: SC-reconstructie of enveloppeplastiek.

### Waar moet u zijn?

De Sint Maartenskliniek probeert haar zorg zo dicht mogelijk bij uw woonplaats te organiseren. Sommige behandelingen, zoals operaties, worden echter slechts op een paar locaties uitgevoerd. Het kan daarom zijn dat niet het gehele traject van uw behandeling op dezelfde locatie van de Sint Maartenskliniek plaatsvindt. De voorbereiding en nazorg kunnen bijvoorbeeld ergens anders zijn dan de operatie. In het bericht dat u van ons ontvangt, melden we altijd de locatie waar u verwacht wordt.