




Sint Maartenskliniek

Afwijkingen aan het been


Aanlegstoornis bovenbeen: Proximale Focale Femur Dysplasie (PFFD)

Bij PFFD is er sprake van een onderontwikkeling of volledige afwezigheid van het bot van het bovenbeen (femur). Afhankelijk van de ernst van de afwijking (type A t/m D), kunnen het kniegewricht en het heupgewricht eveneens aangedaan zijn.




Aanlegstoornis onderbeen: Tibia dysplasie en Fibula aplasie

Hierbij is er sprake van een onderontwikkeling of volledige afwezigheid van het kuitbeen (fibula). Als gevolg hiervan kan er soms een verkromming plaatsvinden van het scheenbeen (tibia). De aangeboren afwijking kan ook invloed hebben op de vorming van de knie, enkel en voet.



Aanlegstoornis onderbeen: Tibia aplasie

Bij tibia aplasie is er geen of onderontwikkeling van het scheenbeen (tibia). Het kuitbeen (fibula) is wel tot ontwikkeling gekomen. Er bestaan verschillende subtypes van deze afwijking, type 1 t/m type 4. Het onderbeen is hierdoor korter en is soms in een bocht gegroeid, waarbij de voet naar binnen gedraaid is. Vaak is er sprake van een flexiecontractuur in de knie, waarbij het niet mogelijk is deze te strekken.



Aanlegstoornis voet /enkel: voetafwijkingen

Er zijn heel veel verschillende soorten aangeboren voetafwijkingen. Enkele voorbeelden zijn klompvoeten, komma voeten, aan elkaar gegroeide tenen en teveel of te weinig tenen.

